

Befall verschiedenen Materials durch Insekten

Art	Name des Insekts		Häufigkeit eines Befalls				
	lateinisch	deutsch	Cell.	Prot.	Holz	Herb.	Kunstst.
<u>Familie</u> Anobiidae Nagekäfer	<i>Anobium punctatum</i>	Gewöhnlicher Nagekäfer	x		x		G
	<i>Ernobius mollis</i>	Weicher Nagekäfer			x		
	<i>Lasioderma serricorne</i>	Tabakkäfer	(x)			x	F
	<i>Stegobium paniceum</i>	Brotkäfer	x	x		x	F
	<i>Xestobium rufovillosum</i>	Gescheckter Nagekäfer (Echte Totenuhr)	x		x		
<u>Ordnung</u> Blattariae Schaben	<i>Blatta germanica</i>	Deutsche Schabe	x	x		x	x
	<i>Blatta orientalis</i>	Küchenschabe	x	x		x	x
<u>Familie</u> Cerambycidae Bockkäfer	<i>Hylotrupes bajulus</i>	Hausbockkäfer			x		B ; S
<u>Familie</u> Dermestidae Speckkäfer	<i>Anthrenus fasciatus</i>	Kabinet- o. Blütenkäfer		x		(x)	B ; S
	<i>Anthrenus museorum</i>	Museumskäfer		x		(x)	
	<i>Anthrenus verbasci</i>	Wollkrautblütenkäfer		x		(x)	
	<i>Attagenus megatoma</i>	Dunkler Pelzkäfer	(x)	x			
	<i>Attagenus pellio</i>	Pelzkäfer		x			
	<i>Dermestes lardarius</i>	Gemeiner Speckkäfer	(x)	x		x	F
	<i>Dermestes maculatus</i>	Dornspeckkäfer		x		(x)	F
<u>Familie</u> Lyctidae Splintholzkäfer	<i>Lyctus brunneus</i>	Brauner Splintholzkäfer			x		S
<u>Familie</u> Ptinidae Diebkäfer	<i>Niptus hololeucus</i>	Messingkäfer	x	x		x	
<u>Familie</u> Tenebrionidae Schwarzkäfer	<i>Tenebrio molitor</i>	Mehlkäfer	(x)	x			S
	<i>Tribolium castaneum</i>	Rotbrauner Reismehlkäfer	(x)	x		x	F
<u>Familie</u> Tineidae Motten	<i>Tinea pellionella</i>	Pelzmotte	x	x		(x)	
	<i>Tineola bisselliella</i>	Kleidermotte	x	x		(x)	B ; F
<u>Ordnung</u> Thysanura Borstenschwänze	<i>Lepisma saccharina</i>	Silberfischchen	x	x			x

Legende: Abkürzungen

Cell.:	cellulosehaltige Stoffe wie Papier u. Textilien (Leinen, Baumwolle)	B	Behälter		
Prot.:	proteinhaltige Stoffe wie Wolle, Seide, Leder, Haar, Pelz u.a.	F	Folien	x:	häufig
Herb.:	getrocknete pflanzliche Stoffe (in Herbarien)	G	Gummi		
Kunstst.:	Kunststoffe	K	Kunststoffe	(x)	vereinzelt
		S	Schaumstoff		